

VACCINAREA

- Previne anual 2,5 milioane decese pe plan mondial și reduce costurile tratamentului specific de boală.
- Prin blocarea răspândirii bolilor, copiii vaccinați sunt ca „un scut” pentru cei din jurul lor: frați prea mici pentru a fi vaccinați, colegi de clasă cu condiții speciale de sănătate și vârstnici.
- Este cea mai bună cale să vă protejați și să-i protejați și pe ceilalți de boală, indiferent de vârstă.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE VACCINARE

Activitățile se realizează:

- la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și prin structurile de specialitate de la nivel regional (CRSP); www.cnscbt.ro/index.php/calendarul-national-de-vaccinare
- la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) județene;
- de către furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și privat;
- de către furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare, în cabinetele medicilor de familie.

INFORMARE despre VACCINARE



Prevenire
Protecție
Vaccinare

Vaccinurile ne apropie!

Vaccinarea împotriva RUJEOLEI



RUJEOLA

- este o boală infecțioasă acută
- este cauzată de un virus
- este foarte contagioasă
- poate declanșa epidemii
- este de **6 ORI** mai infecțioasă decât gripa.
- se transmite rapid în comunitate și între comunități, dacă nu există imunitate colectivă.
- este una din cauzele principale de deces la copiii mici, cu toate că sunt disponibile vaccinuri sigure.

Simptomele includ febră, tuse, rinoree, ochi roșii și erupție cutanată.

1 DIN 5 CAZURI



poate prezenta boli grave ori **complicații**: pneumonie, otită, surditate permanentă, encefalită sau chiar deces.

RUJEOLA la nivel național, conform CNSCBT

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate până în iulie 2020 este de 20204, din care 64 de decese.

În vederea limitării extinderii epidemiei de rujeolă din România, au fost organizate campanii suplimentare de vaccinare a copiilor cu vaccin ROR. INSP-CNSCBT monitorizează această activitate, iar realizările sunt centralizate la nivel național și sunt publicate periodic.

www.insp.gov.ro

RUJEOLA la nivel european, conform Centrului European pentru Controlul Bolilor

O scădere accentuată a cazurilor de rujeolă a fost observată în timpul pandemiei COVID-19 din întreaga lume. Au fost raportate puține cazuri de rujeolă în UE/SEE, inclusiv în țările care anterior au eliminat sau au întrerupt transmiterea endemică.

Până în prezent, în anul 2021, nu au fost raportate noi decese în UE/SEE. În total, în anul 2020, au fost raportate două decese în UE/SEE și Marea Britanie, ambele din Bulgaria.

VACCINURILE

- ✓ Sunt **cea mai bună apărare** pe care o avem împotriva bolilor contagioase grave.
- ✓ Mai mult de **100 milioane de copii** sunt vaccinați anual împotriva bolilor, cum sunt: difteria, tetanosul, tusea convulsivă, tuberculoza, poliomielita, rujeola și hepatita B.
- ✓ Vaccinurile rujeolice sunt **sigure și eficiente**. Acestea sunt supuse unor testări riguroase și au un istoric foarte bun al siguranței după 50 de ani de când sunt folosite.
- ✓ Două doze de vaccin componenta rujeolică oferă aproape **100% protecție** împotriva rujeolei.
- ✓ În perioada 2000-2016, vaccinarea a dus la o **scădere cu 84% a deceselor** prin rujeolă și a prevenit 20,4 milioane decese, ceea ce face din vaccinul rujeolic unul din cele mai bune ajutoare pentru sănătatea publică.